

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ихглюковита для профилактики и лечения эндометрита и субинволюции матки у коров

(организация-разработчик: ООО «БиоФармГарант», 600901, г. Владимир, мк/р-н Юрьеvec, ул. Станционная, д.45)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ихглюковит (Ichglucovit).

Международное непатентованное наименование: ихтаммол, декстроза, аскорбиновая кислота, этанол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Ихглюковит в 100 мл в качестве действующих веществ содержит глюкозу кристаллическую медицинскую (гидратную) - 20,0 г, ихтиол - 3,5 г, кислоту аскорбиновую - 2,0 г, спирт этиловый ректификованный - 2,0 г, а в качестве вспомогательного вещества воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой однородную, маслянистую жидкость тёмно-коричневого цвета, без осадка, с характерным запахом ихтиола. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит. Запрещается применение Ихглюковита по истечении срока годности.

4. Ихглюковит выпускают расфасованным по 100, 200 мл в стеклянных флаконах, по 250, 400 мл в стеклянных бутылках соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 15⁰С.

6. Ихглюковит следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Ихглюковит относится к фармакотерапевтической группе комбинированных антисептических и противовоспалительных препаратов.

10. Ихглюковит обладает антисептическим, противовоспалительным, болеутоляющим действием, стимулирует восстановление функционального состояния матки после родов, способствует регенерации пораженных тканей.

Ихтиол оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

Глюкоза оказывает дезинтоксикационное, метаболическое, регидратирующее действие, участвует в различных процессах обмена веществ в организме, активизирует окислительно-восстановительные процессы, улучшает антитоксическую функцию печени.

Аскорбиновая кислота оказывает метаболическое действие, нормализует проницаемость капилляров, участвует в регулировании углеводного обмена, повышает устойчивость организма к инфекциям.

Этиловый спирт оказывает антисептическое, дезинфицирующее, болеутоляющее действие.

Ихглюковит по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не оказывает местно-раздражающего и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

11. Ихглюковит применяют для профилактики и лечения эндометрита и субинволюции матки у коров.

12. Противопоказанием к применению Ихглюковита является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Ихглюковит вводят коровам парентерально в передневерхний угол прямокишечной ямки справа или слева от анального отверстия в дозе 10 мл/100 кг массы животного:

- с лечебной целью 4-6 раз с интервалом 48 часов;
- с профилактической целью новотельным коровам двукратно: в день отела (или не позднее второго дня после отела) и через 48 часов после первого введения.

Перед введением лекарственного препарата место инъекции обрабатывают антисептическим раствором, после этого Ихглюковит вводят с помощью шприца Жанэ с надетой стерильной трубкой и иглы Боброва. Одномоментным толчком руки иглу вводят в межтканевое пространство тазовой полости под углом 30-45° к поверхности ямки на глубину 3-5 см в направлении мечевидного отростка грудной кости.

14. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлены.

16. Препарат не применяют беременным животным.

17. Следует избегать пропусков введения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности.

18. При применении Ихглюковита в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

19. Ихглюковит запрещается смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами. Применение Ихглюковита не исключает использование других лекарственных препаратов.

20. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после последнего применения Ихглюковита. В случае вынужденного убоя мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

Молоко, полученное от животных, подвергавшихся лечению Ихтиглювитом, запрещается использовать для пищевых целей в период лечения и в течение 72 часов после прекращения его применения. Такое молоко после кипячения может быть использовано для кормления животных.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Ихглюковитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ихглюковитом. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей; они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного назначения

ООО «БиоФармГарант»
600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьевец,
ул. Станционная, д. 45

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «БиоФармГарант»
600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьевец,
ул. Станционная, д. 45

Номер регистрационного удостоверения 12-3-14.15-2990/17ВР-3-19/00070

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Ихглюковита, утвержденная Россельхознадзором 03.11.2010г.