

Инструкция  
по применению лекарственного препарата Зоонорм®  
(Организация-разработчик: ЗАО «Партнер» Москва)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование: Зоонорм®
2. Лекарственная форма: порошок. Зоонорм® содержит живые лиофилизированные клетки бифидобактерий *Bifidobacterium bifidum* штамм № 1, сорбированные на частицах активированного угля с добавлением лактозы.  
В одной дозе препарата содержится не менее  $1 \times 10^7$  колониеобразующих единиц (КОЕ) бифидобактерий.  
По внешнему виду Зоонорм® представляет собой порошок от светло-серого до темно-серого цвета с черными вкраплениями.
3. Зоонорм® расфасован в пакеты из многослойного металлополимерного материала по 5, 10, 100 доз. Пакеты упакованы в картонную пачку по 10, 30 и 100 штук и снабжены инструкцией по применению.  
Срок годности – 18 месяцев с даты выпуска, при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности препарат к применению не пригоден. После вскрытия пакета препарат должен быть использован в течение суток.
4. Зоонорм® хранят при температуре не выше 10°C. Нижняя граница температуры не лимитируется. Допускается хранение (транспортирование) препарата при температуре не выше 25° С не более 10 суток.
5. Хранить в недоступном для детей месте.
6. Пакеты с препаратом без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с измененным цветом порошка, а также остатки препарата, неиспользованные в течение суток после вскрытия первичной упаковки утилизируют с бытовыми отходами.

## II. Биологические свойства

7. Активность препарата Зоонорм® обусловлена наличием микроколоний бифидобактерий, сорбированных на активированном угле, что обеспечивает их высокую сохранность при прохождении через агрессивную среду желудка и тонкого кишечника, и усиливает способность адгезии к слизистой оболочке толстого кишечника. Штамм *Bifidobacterium bifidum* № 1, является антагонистом широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Микроколонии сорбированных бифидобактерий, попадая в экологическую нишу, обеспечивают быстрое восстановление нормальной микрофлоры, активизируют восстановительные и метаболические процессы в слизистых оболочках кишечника, пристеночное пищеварение, синтез витаминов и аминокислот, способствуют более полному усвоению кальция, а также оказывают антитоксическое и иммуномодулирующее действие, обусловленное выработкой пептидогликанов, липополисахаридов, тейхоевых и липотейхоевых кислот.

## III. Порядок применения

8. Зоонорм® применяют всем видам сельскохозяйственных и домашних животных, пушных зверей, птиц и рыб:
- для профилактики и комплексной терапии болезней, протекающих с диарейным синдромом;
  - для профилактики нарушений обмена веществ и повышения естественной резистентности организма животных;
  - для восстановления нормальной микрофлоры кишечника после применения антибиотиков, антигельминтиков, кокцидиостатиков и других химиотерапевтических препаратов;
  - в комплексном лечении микотоксикозов;
  - для повышения сохранности молодняка и увеличения привесов;
  - для профилактики аллергических реакций и уменьшения негативных последствий воздействия стресс-факторов;
  - рыбам при алиментарных токсикозах и заболеваниях бактериальной природы.
9. Противопоказаний для применения препарата не выявлено.
10. С профилактической целью Зоонорм® применяют из расчета 1 доза на 1 кг веса животного курсом 5-10 дней. В случае предстоящей вакцинации или стресса (транспортировки, выставки и пр.), препарат назначают за 5 дней до и 5 дней после воздействия стресс-фактора.

С лечебной целью Зоонорм® назначают:

- молодняку сельскохозяйственных животных и птице индивидуально или групповым методом с молоком, молозивом, заменителем цельного молока, водой или кормом (корм орошают водным или масляным раствором препарата), с первого дня жизни 1 раз в день из расчета 2-3 дозы на 1 кг веса животного в течение 10-15 дней;
- взрослым сельскохозяйственным животным, в т. ч. птице препарат назначают ежедневно 0,5 – 1 дозе на кг веса, при необходимости дозировка увеличивается в 2-3 раза, курс 10-15 дней;
- домашним животным (кошкам, собакам и др.) препарат дают с любой жидкостью или кормом. Животным весом до 5 кг – до 5 доз, от 5 до 10 кг – 10 доз, от 10 до 20 кг – 20 доз, свыше 20 кг – 30-50 доз 2-3 раза в день в течение 7-14 дней. По показаниям курс лечения может быть увеличен до 25-30 дней.
- пушным зверям, лабораторным животным препарат назначают по 2-3 дозы на 1 кг веса животного в сутки в течение 7-14 дней. По показаниям курс лечения может быть увеличен до 25-30 дней.
- рыбам препарат дают с кормом из расчета 5 доз на 1 кг ихтиомассы, в течение 10-15 дней. Препарат разводят в 50-100 мл воды, и орошают сухой (или гранулированный) корм при перемешивании до равномерного пропитывания всей массы корма.
- при эндометритах у сельскохозяйственных животных допускается внутриматочный способ введения препарата, 1 раз в день по 100 доз в течение 3-5 дней. Препарат в количестве 100 доз разводят в 20 мл стерильного растительного масла комнатной температуры.

Недопустимо растворение препарата в горячей (выше 38 °С) воде!

11. При передозировке препарата Зоонорм® нежелательных реакций не выявлено.
12. Особенности лекарственной реакции при первичном или курсовом применении препарата не установлены.
13. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не предусмотрены, курс лечения продолжают.
14. Побочные действия при применении препарата Зоонорм® в рекомендуемых дозах не выявлены.
15. При одновременном приеме препарата с витаминами (особенно группы В), действие препарата усиливается. При приеме антибиотиков рекомендуется интервал между пероральным применением антибиотика и препарата Зоонорм® составляет не менее 4-5 часов.

16. Ограничений в сроках убоя сельскохозяйственных животных на мясо, использовании молока, яиц и другой продукции животноводства после применения препарата Зоонорм<sup>®</sup> нет.

#### **IV. Меры личной профилактики**

17. При применении Зоонорма<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.
18. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются.
19. Необходимость в оказании первой помощи отсутствует в связи с безопасностью лекарственного средства.
20. Наименование и адрес производителя лекарственного препарата:  
ЗАО «Партнер» 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 31.  
Адрес места производства лекарственного препарата: 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Южная, д. 11.

Инструкция разработана ЗАО «Партнер» 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 31

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором от 14 ноября 2006 года.